

NATUURHISTORISCH MAANDBLAD

Orgaan van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Hoofdredactie : P. H. Schmitz S.J., Ignatius College Valkenburg (L.) Telef. 35. **Mederedacteuren** : te Maastricht: Jos. Cremers, Hertogsingel 10; J. Pagnier, Alex. Battalaan; G. H. Waage, Prof. Roerschstr. 4; te Beek (L.): F. J. H. M. Eyck, Drukkerij v.h. Cl. Goffin, Nieuwstr. 9, Maastricht. Tel. 45.

Verschijnt Vrijdags voor den eersten Woensdag der maand en wordt den Leden van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg gratis en franco toegezonden. Prijs voor niet-leden f 3.60 per jaar, afzonderlijke nummers 30 cent. Auteursrecht voorbehouden.

Atelier REMBRANDT

Groote Staat 46,

Maastricht.

∴ Speciaal adres voor het vervaardigen van Foto's voor wetenschappelijke doeleinden, zoals het fotograferen van insecten, mineralen, bloemen, enz. enz. — — — — —

Prijscourant op aanvraag.

Grand Hôtel „Du Lévrier et de L'Aigle Noir“,

Boschstraat 76, Maastricht.

Maastricht.

Centrale verwarming.

Stroomend water op alle kamers.

**Diners à prix fixe
van 5-7½ uur.**

APARTE ZALEN

voor groote en kleine
GEZELSCHAPPEN.

Auto-garage in 't Hôtel.

„DE NEDERMAAS”

LIMBURGSCH GEILLUSTREERD MAANDBLAAD.

Verschenen is het 6^e nummer van den 3^{en} Jaargang.

INHOUD:

DE TWIË LOERJEEGERS. (Meerssens Dialect). — LIMBURGSCHE PORTRETEN. Z. Exc. M. C. E. BONGAERTS, Minister v. Waterstaat — REFUGIEHUIZEN TE MAASTRICHT. — VIJLEN. (ZIJN STICHTER EN ZIJNE „BOEISCH”). Miskenning of onkunde? — WATERSNOOD EN OVERSTROOMINGEN IN VROEGERE DAGEN. — OUD- EN NIEUW-HEERLEN. — LIMBURGSCHE MIJNWERKERS-SAGEN. — BOEKBESPREKING — — — — —

Vraagt proefexemplaar: Bouillonstraat 6,
of aan de Drukkerij voorh. Cl. Goffin, Nieuwstraat 9.

Prijs per aflevering fl. 0.40 — per Jaargang franco per post fl. 4.— bij vooruitbetaling, (voor buitenland verhoogd met porto).

Van het „MAANDBLAAD” № 5 14^{de} jaarg.
zijn geen losse exempl. meer verkrijgbaar.
Van dit werk verscheen een afzonderlijke
uitgave, waarvoor wij verwijzen naar de
annonce op pag. 3 van dezen omslag.

NATUURHISTORISCH MAANDBLAAD

Orgaan van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Hoofdredactie : P. H. Schmitz S. J., Ignatius College Valkenburg (L.) Telef. 35. **Mederedacteuren :** te Maastricht: Jos. Cremers, Hertogsingel 10; J. Pagnier, Alex. Battalaan; G. H. Waage, Prof. Roerschstr. 4; te Beek (L): F. J. H. M. Eyck. **Drukkerij v.h. Cl. Goffin**, Nieuwstr. 9, Maastricht. Tel. 45.

Verschijnt **Vrijdags** voor den eersten Woensdag der maand en wordt den Leden van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg gratis en franco toegezonden. Prijs voor niet-leden f 3.60 per jaar, afzonderlijke nummers 30 cent. Auteursrecht voorbehouden. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

INHOUD : Aankondiging Maandelijsche vergadering. — Nieuwe leden. — Maandelijsche vergadering, gehouden op 6 Januari 1926, in het Museum. — Aan onze leden. — Wie volgt? — W. J. Jongmans en F. H. van Rummelen, Waarnemingen over de storing van Schrijversheide aan de oppervlakte. — H. Schmitz S. J., De voortzetting van mijne Monographie „Die Phoridae von Holländisch-Limburg” etc. — Dr. L. Peeters S. J., Ademhaling van Hydrophilus Piceus. — H. Schmitz S. J., Zur Literatur und Forschungsgeschichte der Phoridae. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Maandelijsche Vergadering
op WOENSDAG 3 FEBR. 1926
in het Natuurhistorisch Museum,
precies om 6 uur.

NIEUWE LEDEN,

C. Nadaud, Industrieel, Oude Tweebergenpoort 1, Maastricht; Br. Bernardus, Klooster der Eerw. Paters van het H. Hart, Heerderweg, Maastricht; P. v. d. Linden, Leeraar G. H. B. S., Tongerscheweg 7b, Maastricht; Jan P. Strijbos, Architect, Bentveld bij Haarlem, Bentvelderweg 12.

MAANDELIJSCHE VERGADERING, gehouden op 6 Jan. 1926, in het Museum.

Aanwezig zijn de heeren: W. de Backer, Fr. Paulussen, Em. Caselli, P. H. Bouchoms, P. Peters, Dr. Jos. Beckers, Aug. Kengen, H. Wijsen, L. H. A. Leysen, Edm. Nyst, J. Maessen, A. Kostermans, Dr. v. d. Meer, Jos. Cremers, F. H. van Rummelen, P. Vroom.

Circa 6 uur n.m. opent de Voorzitter (Rector Cremers) de vergadering met een hartelijk Nieuwjaarswens voor het Genootschap en zijne leden. Hij memoreert de aanwinsten van het Museum in het afgelopen jaar, waarbij hij speciaal nadruk legt op de waardevolle schenking van den Heer Caselli, die ons Museum verrijkte met tal van Mosasaurusfragmenteen en andere krijtfoessielen. De bijzondere dank aan den Heer Caselli wordt door de vergadering met een applaus onderstreept.

Voorts wijst de Voorzitter nog op de publicatie's van ons Genootschap in 1925. Ons Maandblad mag gezien worden en spreker hoopt, dat het zich op hetzelfde peil zal kunnen handhaven.

Dr. van der Meer vraagt of de hertengeweien van den Oud-Valkenburgerweg, collectie Caselli, afkomstig zijn uit het kriet.

De heer van Rummelen antwoordt, dat deze geweiën op zijn hoogst een diluviaal ouderdom zullen hebben. Ze werden gevonden aan de basis van de Limburgsche klei, welke daartoe plaatse het kriet bedekt en uit het kriet ontstaan is. Waarschijnlijk lieten de betreffende herten hier hun geweiën achter op het moment, dat de eerste laag verweerd kriitmateriaal het aan de oppervlakte gelegen kriet overdekte.

Op een vraag van den heer van Rummelen, of er door de leden iets was bemerkt van de aardbeving, welke zich ongeveer middernacht van 5 op 6 Jan. l.l. in Limburg deed gevoelen, werden door verschillende Heeren bevestigende antwoorden gegeven. Hieruit bleek dat een schok was waargenomen te Maastricht, Caberg, St. Pieter, Valkenburg en Keer. Als tijd moet voor Maastricht ongeveer 11.58 n.m. worden aangenomen.

De heer Nyst heeft eenige foto's medegebracht van den Mammouth van Lierre en de Inguanodonten van Berninsart, die hij het Museum aanbiedt.

De heer van Rummelen geeft een korte explicatie van de vindplaats der Inguanodons. Bij het maken van een onderzoekingsgalerij op 322 Meter onder de oppervlakte of 300 Meter onder Ostendes peil, kwam men van het steenkolenbergte inlagen van de Wealdformatie, welke hier het steenkolenbergte bedekten. Bij het drijven van een tweede galerij op een diepte van 356 Meter onder de oppervlakte, bleek

dat men wederom in Weald terecht kwam. Het bleek dus dat men een onregelmatigheid in de oppervlakte van het carboon moest aannemen, en wel waarschijnlijk een trechtervormige verdieping in het carboon-oppervlak (Puit naturel). Het verdere onderzoek leidde tot het vinden van de geraamten van 25 Inguaudons, die thans in het Musée royal d'Histoire naturelle te Brussel zijn ondergebracht.

De Voorzitter verzoekt namens Prof. Du-bois, hem zoo mogelijk gegevens te verstrekken van lichaams gewicht en hersens gewicht van Bunsing, Das en Hermelijn, Hazelmuis, Spitsmuizen. Ook complete dieren zijn in verschen toestand welkom, om eventueel aan Prof. Du-bois te worden gezonden.

Pastoor **Kengen** vertoont eenige prae-historische voorwerpen uit de opgravingen van Bel-védère, een beitel vervaardigd uit vuursteen, een hamer vervaardigd uit fijnkorrelige zandsteen (Devoon- of Carboon-zandsteen) en een aangeslepen voorwerp vervaardigd uit lydict. Alle voorwerpen waren gepolijst.

Op een vraag van den heer **Bouchoms** of de geologie van Limburg eens systematisch zoude kunnen behandeld worden in ons Maandblad antwoordde de heer van Rummelen, dat zulks nog moet wachten op enkele andere geologische publicatie's. De Voorzitter voegt hieraan toe, dat hem juist hedenmiddag veel copie was toegezegd over geologie en palaeontologie van Zuid-Limburg.

De heer **Caselli** vestigt de aandacht van de leden van het Genootschap op het voorkomen van verschillende soorten Zwammen in de Daal-hcimer groeve te Valkenburg en noodigt hen tot de bezichtiging hiervan uit, wijl die Zwammen nu op hun mooist zijn.

De heer **de Backer** vraagt of het mogelijk zoude zijn meerdere lezingen te doen houden op de maandelijksche vergaderingen.

De Voorzitter antwoordt, dat hem voor de volgende vergadering een lezing met lichtbeelden van den heer Waage is toegezegd.

De heer **van Rummelen** zegt, daartoe uitgenoodigd, toe zijn lezing over het Carboon, welke hij in Heerlen voor enkele maanden heeft gehouden, nog eens te Maastricht te zullen herhalen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter om circa 8 uur de vergadering.

AAN ONZE LEDEN.

Ons stukske in No. 11 van den afgelopen jaargang, getiteld: „de Avifauna is af! Wat nu?....” heeft, naar we merken, zoo hier en daar, onrust gesticht;

Den schijn verwekt dat ons Maandbladlijdende is aan bloedarmoede, gebrek heeft aan copie, aan voedsel.

Niets is minder waar!

Dank der belangstelling van zeer velen uit de Natuurhistorische wereld kunnen we de kolommen van het Natuurhistorisch Maandblad

Orgaan van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, zóódanig van wetenschappelijken kost voorzien, dat 't alle kans heeft nog uit te dijen, in omvang toe te nemen.

Doch daarvoor behoeft 't de hulp onzer Leden. Wasdom immers doet uit de kleeren groeien, brengt met zich mee, dat de wassende spruit zoo nu en dan in nieuwe kleeren gestoken moet worden.

Niet dat we voor ons wassend Maandblad 'n plunje zouden vragen van andere snit dan 't nu draagt.

O neen!

Da's verre van ons.

Iimmers die snit is naar de allerlaatste mode.

En 't pakje, waarin 't Maandblad zich bij z'n lezers aandient, staat hem maar wat goed.

Alléén — mochten onze leden graag zien dat 't blad uitdijt, dan moeten ze ons naar best vermogen helpen om stoffage te koopen, waar-aan 't groeiende, gedijende wicht alsdan behoeft krijgt.

Z'n pakje is oogenblikkelijk gemaakt uit 12 bladzijden drucks. We zien aankomen dat zulks dra te weinig zal blijken, dat we genoodzaakt zijn in z'n kleedje 'n paar banen in te voegen.

Dat gaat heel gevoegelijk mits.... onze leden ons helpen.

Hoe?....

Wel heel eenvoudig!.

Als in 't jaar 1926 elk der leden nou 'ns één (zegge één) nieuw lid aanwierf, wel dan kwam er zoóveel geld in 't laadje van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg dat 't z'n troetelkindje, het Maandblad, dat uit de kleeren dreigt te wassen, in heel ruime rokken zou kunnen steken.

DE REDACTIE.

WIE VOLGT?....

(Boekerij).

Op de Maandel. Vergadering van 2 Dec. l.l. werd dankbaar melding gemaakt van de ontvangst van enige boekwerken voor de Boekerij van het Genootschap. „Laten we hopen, dat meerdere leden ook eens onze bibliotheek zullen gedenken” zeiden we bij die gelegenheid.

Die hoop is, tot ons groot genoegen, bereids in vervulling gegaan.

Van ons medelid den heer C. A. Idzerda toch ontvingen we, behalve 'n aantal Maandbladen en Jaarboeken uitgegeven door 't Nat. Hist. Gen. in Limburg, de volgende werken: **L. J. G. Dumoulin**, Guide du Botaniste dans les environs de Maestricht; **Dr. H. J. Calkoen**, Plantentlas; **Dr. J. Th. Oudemans**, de Nederlandse Insecten.

Van ons nieuw lid den heer C. Nadaud kregen we: **Nicolas Lemery**, Dictionnaire ou traité universel des drogues simples etc., Rotterdam chez Jean Hofhout, 1729.

Den Schenkers dank!

Wie volgt?....

WAARNEMINGEN OVER DE STORING VAN SCHRIJVERSHEIDE AAN DE OPPERVLAKTE,

door

W. J. JONGMANS en F. H. VAN RUMMELEN.

Mededeeling No. 5
van het Geologisch Bureau voor het
Nederlandsch Mijngebied.

Eenigen tijd geleden werd in het verlengde van de Gasthuisstraat in Heerlen langs het Sanatorium een daar bestaande weg verbreed en verdiept tot een groten weg. Deze voert van de Gasthuisstraat over de Caumerbeek, in Oostelijke richting langs het Sanatorium naar het nieuw te bouwen Abattoir der Gemeente Heerlen. Bij deze werken kregen wij een goed inzicht in den bouw van het terrein daar ter plaatse. Alvorens over te gaan tot een beschrijving van het waargenomen profiel, zal het goed zijn eenige algemeene mededeelingen te geven omtrent de geologische verhoudingen en het verloop der belangrijkere storingen in deze omgeving.

Het gebied ligt oostelijk van de storing van Heerlerheide. Deze strijkt hier N. W. ten N.—Z. O. ten Z., en wel aan de oppervlakte ongeveer langs Emmastraat—Wilhelminaplein—Willemstraat naar het punt even oostelijk van de splitting van de wegen Heerlen, Sittard—Heerlen, Brunssum. Ongeveer evenwijdig hieraan, iets meer Noord-Zuid, is de storing van Schrijversheide in den ondergrond bekend.

De oppervlakte, waarop Heerlen is gebouwd, bestaat westelijk van de storing van Heerlerheide uit oligocean zand en klei (Cerithienklei), bedekt door een diluviaaldek. Oostelijk van die storing kan men twee gevallen onderscheiden, die door een lijn: Oliemolenstraat, Mijn Oranje Nassau II (Carl) van elkaar worden gescheiden. Deze lijn kruist de Molenberg-bouwing zoodanig, dat de nieuwe broeder-school er noordelijk en het kruis aan den hoek van de Molenberglaan er zuidelijk van liggen. Noordelijk van deze lijn vindt men onder het diluviaal dek mioceen wit zand met blauwe vuursteen. Dit zand is gedeeltelijk tot zandsteen verhard, de bekende Nievelsteiner zandsteen. Hiervan kan men b.v. in de groeve bovenaan de Oliemolenstraat nog enkele stukken waarnemen. Dit mioceen zand wigt in zuidelijke richting uit en wordt dus steeds dunner om langs de genoemde lijn geheel te verdwijnen. Hieronder ligt oligocean.

Zuidelijk van deze lijn vindt men het oligocean direct onder het diluviaaldek.

Een ander verschil tusschen de gedeelten van Heerlen, oostelijk en westelijk van de storing van Heerlerheide, is, dat westelijk ervan onder het oligocean krijt en karboon volgen, terwijl

oostelijk onder het tertiair alleen karboon en geen krijt ligt.

Het diluviaaldek bestaat uit grit en Limburgsche klei. Het bedekt dus het geheele terrein. In de herkomst van het grit is echter verschil, een verschil echter, dat met de boven- genoemde verschillen in het voorkomen van het tertiair niets te maken heeft. Een deel ervan moet gerekend worden tot het hoogterras, een deel tot het middenterras. De scheiding tus- schen beide valt ongeveer samen met de Caumerbeek. Westelijk van deze beek behoort het grit tot het middenterras, oostelijk tot het hoogterras.

Ter plaatse van het Sanatorium mag men dus, in verband met het hierboven aangegeven, onder normale omstandigheden, als dus alle lagen onverplaatst zijn, van onder naar boven gerangschikt, verwachten: Karboon, oligocean, hierboven een in zuidelijke richting uitwiggende miocean-bedecking, die dus een varia- ble dikte kan hebben. Dit miocean wordt bedekt door een laag hoogterras, grit, die over het geheele terrein is uitgespreid, en deze weer door een laag Limburgsche klei.


Echter op de hellingen, die den overgang vormen tusschen hoogterras en middenterras, heeft een onderbreking plaats in de uniforme gritbedekking. Langs die hellingen is een deel van het hoogterras-grit naar beneden gegleden en ligt op die hellingen als hoogterras-relikten met een onregelmatige omgrenzing.

Dit kan men nu in de schets van het profiel der weginsnijding zeer goed waarnemen.

Evenzoo vindt men in de hogere lagen van het profiel o.a. bij 40—60 M. onregelmatige afzettingen tengevolge van omwassching van de hogere lagen van het miocean bij de afzetting van het diluvium.

Hieronder echter vindt men een duidelijk en, wat de lagen betreft, regelmatig profiel, waarin vooral een laag met blauwe vuursteen en in de diepere gedeelten een laagje oligocean zand, dat duidelijk groen gekleurd is, opvallen. Uit de geringe dikte van het miocean blijkt duidelijk, dat wij hier reeds dicht zijn bij de lijn, waarlangs het miocean uitwigt.

Door hellingen en storingen bleek in onze weginsnijding de dikte der verschillende lagen, voorzoover zij zichtbaar zijn, vrij sterk te variëren.



Limburgsche klei	1.50—2.00 M.
Diluviaal grit (hoogterras-relict)	0.75—1.00 M.
Fijnkorrelig wit zand: (Mioceen)	1.00—1.50 M.
Blauwe vuursteenlaag	0.10 M.
Fijn, wit zand (Mioceen)	1.00—1.50 M.
Fijn, groen glauconietzand (Oligocean)	0.50 M.
Fijn, geel zand (Oligocean)	3.50 M. in het Westelijk deel van den weg.

Tengevolge van de helling van den weg, die naar het Oosten stijgt (het beginpunt ligt op 107,75 M. + A. P. en het eindpunt op 113,25 M. + A. P.), duiken alle lagen voortdurend (afgezien van opheffingen tengevolge van storingen) in deze richting onder de wegoppervlakte. Maar zelfs, als de weg horizontaal zou liggen, zouden de lagen, zij het dan ook onder een kleinere hoek, onder het oppervlak van den weg duiken. Wel zijn zij oorspronkelijk horizontaal afgezet, maar ze vertoonen nu overal een grootere of kleinere helling in oostelijke richting. Deze helling vindt wel haar oorzaak in de gevolgen van de grootere storingen in de omgeving, vooral van de storing van Heerlerheide.

Over een afstand van ca. 90 M. konden in de insnijding zes storingen, die in oostelijke richting verwerpen, en tien, die dit in westelijke richting doen, geconstateerd worden. In vele gevallen waren duidelijk afgetekende storingsspleten te zien, in andere gevallen kon de aanwezigheid van een storing afgeleid worden uit de ligging der verschillende lagen, waarbij vooral de blauwe vuursteenlaag en het bankje groenzand met succes konden gebruikt worden. De grootste verwerpingshoogte werd gevonden bij de storing bij 92 M. en bedraagt 4.00 M. Deze verwerpt in westelijke richting. De storingen, die in oostelijke richting verwerpen, zijn alle onbelangrijk, wat verwerpingshoogte betreft. De totale verwerping aller storingen in oostelijke richting is 3.10 M. en van die in westelijke richting 8.20 M. Uit het onregelmatig naast elkaar liggen van storingen met Oost- en West-verwerping volgt, dat de beweging in de storingszone, om welke reden dan ook, niet steeds in dezelfde richting werkzaam was. De algemeene strekking der storingszone is dus eene verwerping in westelijke richting.

Deze conclusie komt overeen met de verwerping van de storing van Schrijversheide in den ondergrond. Waar ook topographisch overeenkomst bestaat tusschen deze storing in den ondergrond en de in de insnijding gevonden zone in den bovengrond, mag hieruit geconcludeerd worden, dat het in de weginzijding waargenomen complex van storingen hetzelfde is als de storing van Schrijversheide in den ondergrond. Deze storing is daar eveneens niet in den vorm van een enkele storing, maar als meerdere kleine verwerpingen vastgesteld.

Bovendien kon in de weginzijding met groote zekerheid als strijkrichting der storin-

gen eene Noord-Zuid richting worden vastgesteld. Deze zelfde strijkrichting toont ook de storing van Schrijversheide in den ondergrond.

In het algemeen kan men in Limburg, behalve bij de storingen met eene zeer groote verwerpingshoogte, slechts zelden storingen aan de oppervlakte traceeren. Immers, de lagen, die den vasten ondergrond (karboon, met of zonder kriet of trias) bij ons bedekken, bieden weinig variatie en zijn elk voor zich tamelijk dik. Hierdoor kan men slechts bij uitzondering lagen van zoodanig verschillend uiterlijk, dat zij tot conclusies omtrent verwerpingen aanleiding kunnen geven, in zijdelingsch contact met elkaar vinden. Het komt slechts zelden voor, dat men in een profiel dergelijke duidelijke spletten kan waarnemen, en het is alleen aan de aanwezigheid der blauwe vuursteenlaag te danken, dat wij in dit geval ook verwerpingen konden vaststellen.

Het is van groot nut zulke storingen aan de oppervlakte vast te leggen, daar zij zeer belangrijke gegevens voor den mijnbouw en voor de kennis en de beoordeeling van den ondergrond opleveren. Maar vooral in verband met bodembewegingen, die nog heden ten dage plaats vinden, is het van het grootste belang, dat storingen, zij het dan ook slechts lokaal, aan de oppervlakte getraceerd worden. Uit de literatuur (¹) blijkt, dat op vele plaatsen nog steeds langs de storingen beweging plaats vindt, waardoor verschuivingen, scheuren en ook tektonische aardbevingen met alle gevallen ervan kunnen voorkomen. Zoo werden ook de aardbevingen van Herzogenrath in 1873 en 1877 door Lasaulx aan tektonische bewegingen, die in verband werden gebracht met de Feldbiss, toegeschreven (²) en hetzelfde is waar-

¹⁾ Haussmann. Sitzungsber. Niederrh. Geol. Ver. für 1909 (1910), p. 68 (Waarnemingen in Nordstern).

Renier. Les gisements houillers de la Belgique. Chap. XIX. Sismicité. Ann. des Mines de la Belgique, 1921, XXII, p. 51. (Verband tusschen aardbevingen en Tektoniek).

Sieberg. Erdbetekenkunde, p. 230.

Regelmann. Neuzeitliche Schollenverschiebungen im Bodenseegebiet. Ber. 40. Vers. Oberrhein. Geol. Ver. zu Lindau, 1907.

Köhler. Geodetische Untersuchungen über die tektonischen Bewegungen aus der Erzlagerstätte von Przibram. Oesterr. Zeitschr f. Berg- und Hüttentk. 1913.

Schmidt. Untersuchungen von Höhen- und Lageänderungen von Messungspunkten im bayerischen Alpenvorland. Sitzungsber Bay. Akad. d. Wissenschaft. 1918.

Niemczyk. Die tectonische Absenkung des Beuthener Erz- und Steinkohlenbeckens und ihre Bedeutung für die Beurteilung von Bergschäden. Glückauf, 1923, No. 40, 41, 42.

Schmidt. Westwanderung von Hauptdreieckspunkten infolge neuzeitlicher tektonischer Bewegungen im bayerischen Alpenvorland. Sitzungsber. Bay. Akad. d. Wissenschaft. 1920.

Buitendien deelde Prof. Bärtling, Berlin, per brief van 4-2-'23 verschillende waarnemingen over zulke bewegingen in Westfalen mede.

²⁾ Lasaulx. Das Erdbeben von Herzogenrath am 22 Oktober 1873, Bonn. 1874.

Lasaulx. Das Erdbeben von Herzogenrath am 24 Juni 1877. Bonn. 1878.

schijnlijk het geval met de in het laatste jaar in Limburg en omgeving waargenomen aard-schokken.

Kan men dus behalve het vorhanden zijn van storingen nog, zooals in onze wegensnijding het geval is, de strijkrichting der storing aangeven, dan is het voor ieder duidelijk, dat men in zulke waarnemingen een zeer goed hulpmiddel heeft ter beantwoording van meerdere der hierboven aangeduide vragen.

Heerlen, 19 Januari 1925.

DE VOORTZETTING VAN MIJNE MONOGRAPHIE „DIE PHORIDEN VON HOLLÄNDISCH-LIMBURG”; etc.

door H. Schmitz S. J.

In de vroeger door ons Genootschap uitgegeven Jaarboeken heb ik destijs de eerste vier deelen gepubliceerd van eene monographische studie op dipterologisch gebied „Die Phoriden von Holländisch-Limburg, mit Bestimmungstabellen aller bisher kenntlich beschriebenen europäischen Phoridenarten“. De hoop, dit werk in dezelfde wijze te kunnen voltooien als het begonnen was, werd door verschillende omstandigheden verijdeld, o.a., wat het formaat betreft, door het niet verder verschijnen der oude „Jaarboeken“. Maar ook om intrinsieke redenen is het thans, na een onderbreking van bijna zes jaren, volstrekt onmogelijk, de aangevangen monographie in den geest der eerste vier deelen voort te zetten en af te sluiten. Er is onder-tusschen te veel veranderd, te veel nieuws ontdekt, er zijn te veel aanvullingen haast op elke bladzijde bijgekomen. Om echter toch iets volledigs over Limburgsche Phoriden te kunnen geven, heb ik het plan opgevat om voor het „Maandblad“ eene lijst van alle tot nu toe in de Nederl. provincie Limburg gevonden Phoriden samen te stellen, met vermelding ook van de nog niet aangetroffen Europeesche soorten. Aan die lijst zal ik eene reeks van artikelen laten voorafgaan, welke noodig zijn, om de op de lijst zelf voorkomende veranderingen te motiveren, nieuwe genera op te richten, nieuwe soorten te beschrijven, synonymische en andere kwesties uit te maken enz. Ik begin reeds in dit nummer met eene kritische studie over de Phoridenliteratuur.

ADEMHALING VAN HYDROPHILUS PICEUS.

In de vergadering van 3 Sept. 1924 (zie Maandblad 1924, bl. 122) bespreekt mijn collega en vriend H. Schmitz S.J. de proeven van Przibram over de ademhaling van de pikzwarte watertor en zegt naar aanleiding daarvan: „Kort en bondig zeggen Hoogeveen en Peeters in hun Leerboek der dierkunde: De pikzwarte watertor maakt van haar sprieten gebruik om boven den waterspiegel versche lucht op te nemen“.... „Deze „Angabe“ is na-

melijk, wat de sprieten betreft, volgens de waarnemingen van Przibram ten eenenmale onjuist". In de derde uitgave van ons Leerboek die in April van dit jaar verscheen, hebben wij bovenstaanden zin zonder het minste gemoedsbezaar laten staan. Vooreerst omdat de dieren volgens de mededeeling van Schmitz na de amputatie slechts 2—3 weken leefden. Met de sprieten toch kunnen ze het in een aquarium best den heelen zomer volhouden. Verder is de afbeelding van Nitzsch in Winterstein's Handbuch der vergl. Physiologie I bl. 464 zoo duidelijk, dat Nitzsch zich in de waarneming bijna niet vergist kan hebben. Trouwens we lezen bl. 465: „v. Fricken bestätigt fast durchweg Nitzschs Angaben." (Biol. Centr. bl. 1887).

Het bleek mij echter, dat mijn eerste argument tegen Przibram niet opging. Want in de Zool. Anz. Bd. 60, bl. 254 staat, dat hij de sprieten afsneed op 11 Maart 1924 en de dieren 31 Mei 1924, toen hij het artikel schreef, nog leefden. Door zijn proeven is dus wel afdoende bewezen, dat de tor de sprieten bij de ademhaling in het water missen kan. Maar geenszins volgt er uit, dat zij ze er ook niet voor gebruikt en daar gaat het toch om.

Had Przibram meer voor oogen gehad, wat in het aangehaalde werk van Winterstein te lezen staat op bl. 195 en vlg., dan had hij wellicht niet zoo boud gesproken. Daar immers worden proeven beschreven omtrent de ademhaling der Amphibiaën en hoe o.a. reeds door de proeven van Spallanzani gebleken is, dat b.v. kikkers in leven kunnen blijven zonder longen, als hun maar gelegenheid gegeven wordt, de noodige zuurstof op te nemen door de huid. Maar niemand zal nu toch na die proefnemingen durven beweren, dat de kikker zijn longen niet gebruikt voor de ademhaling!

In zijn conclusies is Przibram dus te ver gaan, in zijn waarnemingen niet ver genoeg.

„Ich habe.... die Atmung des *Hydrophilus piceus* beobachtet und gefunden, dass er zwischen Kopf und Halsschild direkt, d.h. ohne

jede Beteiligung des Fühlers, Luft aufnimmt". Aan de juistheid der amputatieproeven van Przibram twijfel ik niet, maar de waarnemingen aan het ongeschonden dier heb ik herhaald. Weken achtereenvaer heeft een aquarium met *Hydrophilus* naast mij op mijn lessenaar gestaan, zoodat ik hem voortdurend kon gadeslaan. Wat bleek nu? Dat de kever inderdaad blijkbaar tussen kop en halsschild lucht opneemt, maar volgens mijn waarnemingen toch niet „ohne jede Beteiligung des Fühlers". Als ik de loupe er bij gebruikte, zag ik zeer duidelijk, dat de linker spriet toch ook dan nog herhaaldelijk boven het water uitstak. Heeft Przibram daarop ook gelet, als de kever bezig was met kop en halsschild adem te halen? Maar ook afgezien hiervan, meermalen heb ik mijn *Hydrophilus* denzelfden stand zien aannemen als in de figuur van Nitzsch met de spriet alleen boven water, daarbij dezelfde ademhalingsbewegingen makend met het achterlijf, als in de gevallen, waarin hij tevens kop en halsschild boven water brengt. Bij de figuur van Nitzsch zou iemand die skeptisch aangelegd is, nog eenigszins kunnen twijfelen, of kop en halsschild wel werkelijk onder water geweest zijn; het getekende lichaam ligt vooraan ongeveer evenwijdig met den waterspiegel en tamelijk dicht er bij: na het artikel van Przibram is zoo iemand dan allicht geneigd te denken: Nitzsch heeft niet goed gekeken. Die twijfel is echter, ook zonder de waarnemingen van v. Fricken, ongegrond; in dien stand is alles duidelijk waar tenemmen. *Hydrophilus* was echter zoo welwillend het mij nog beter te laten zien; van tijd tot tijd ging hij namelijk verticaal in het water staan, met kop en al onder de oppervlakte, alleen de spriet er boven uit; het achterlijf maakte weer de gewone ademhalingsbewegingen. Een ander bewijs dan dit laatste kan ik niet leveren tegen een mogelijke bewering van Przibram, dat de kever in dien stand geen versche lucht tegen afgewerkte opgenomen heeft.

Dr. L. PEETERS S.J.
Amsterdam, 27 December 1925.

ZUR LITERATUR UND FORSCHUNGSGESCHICHTE DER PHORIDEN

von

H. SCHMITZ S.J., (Valkenburg, Holland).

Die gesamte auf Phoriden bezügliche Literatur umfasst nach meiner Zusammenstellung gegenwärtig rund 400 Nummern. Sie scheint in einer Art von geometrischer Progression zu wachsen; denn etwa 55 Nummern kommen auf die Periode von 1763—1850, etwa 125 auf die Zeit von 1850—1900, der Rest von 220—230 auf die ersten fünfundzwanzig Jahre unseres Jahrhunderts.

Es wird hier nicht beabsichtigt, ein vollständiges Verzeichnis der Phoridenliteratur zu

bieten; statt dessen wird versucht, einmal deren Hauptinhalt in grossen Zügen kritisch darzustellen.

Das in den letzten Jahrzehnten in der Erforschung der Phoriden Geleistete ist naturgemäß heute am besten bekannt und am leichtesten in seinen Quellen erreichbar, braucht also weniger eingehend besprochen zu werden. Um so ausführlicher sind im Folgenden die Anfänge der Phoridenforschung und die wichtigeren Arbeiten der ältern Autoren behandelt.

A. XVIII. Jahrhundert.

Die erste Phoride überhaupt ist von Scopoli 1763 beschrieben worden, und zwar als *Musca* mit dem charakteristischen Beinamen *festinans* (*Entomologia carniolica* p. 349). „*Celeriter cursitat, saepius quiescens, hinc festinando defatigata*“ heisst es unter anderm in der Diagnose. Wie diese Worte, so passt auch das Gesamtbild der Beschreibung deutlich auf eine Phoride, wie bereits Schiner (1856, 417) vermutet hat, reicht aber zum Erkennen der Art nicht aus.

Eine andere, nur *Musca* genannte Phoride wird von E. L. Geoffroy (1764 p. 533) als „*mouche noire avec un trait noir sur la moitié du bord extérieur de l'aile*“ angeführt. Es war nach der Ansicht Latreilles (1809, p. 360) eine echte *Phora*. Ihre dunkeln Vorderrandadern erschienen Geoffroy als ein „*schwarzer Strich*“.

In der 12. Auflage des *Systema Naturae* von Linné (1766 Nr. 84) begegnen wir einer *Musca subsultans*, die folgendermassen gekennzeichnet wird: „*antennis setariis pilosa tota atra, alis hyalinis, femoribus posticis saltatoriis. Habitat in Suecia, volitat saliendo cadendoque femoribus quasi dependentibus; quiescens territa salit ut Pulex. Magnitudo Pulicis absque ulla albedine*“. Die Typen, welche dieser Beschreibung zugrundelagen, sind von Haliday untersucht worden. Haliday bezeugt (1851, p. 144), dass in der Linnéischen Sammlung in London unter dem Namen *subsultans* ein von Linné selbst bezetteltes Exemplar der später von Fallén als *Trineura mordellaria* von neuem beschriebenen Phoride vorhanden sei; daneben stecke „*ein Fragment einer andern Phora, anscheinend aterrima Meig.*“ Es handelt sich also, wie auch die Beschreibung verrät, um eine Mischart. Da in einem solchen Falle nach den heutigen Nomenklaturgebräuchen der ursprüngliche Name für eine der unter den Typen vertretenen Arten beibehalten werden muss, so habe ich mich seinerzeit dafür entschieden (56 130), die Fallénsche Art, die inzwischen zum Typus der Gattung *Hypocera* Lioy erhoben wurde, in Zukunft als *Hypocera subsultans* (L.) zu bezeichnen (siehe auch im folgenden Abschnitt „Typenuntersuchungen“).

Aehnlich wie Linné's *Musca subsultans* ist auch *Empis minuta* Fabricius (*Mantissa Insectorum* 1787 Vol. 2 p. 365) erst spät als Phoride erkannt worden und zu ihrem Rechte gekommen. Man wusste lange nicht, was für eine Diptere hinter dieser angeblichen *Empis* stecke. Loew war der erste, der die Vermutung aufstellte (1860, p. 36), es sei eine Phoride, und diese Vermutung wurde von Lundbeck, der die Type wiederauffand, 1910 bestätigt. Später (1922, p. 121) teilte dann Lundbeck mit, dass die Fabriciussche Art identisch sei mit der, welche Malloch (1908, p. 12) als *Phora pubbericornis* von neuem beschrieben hat. Diese interessante Feststellung macht es eini-

germassen begreiflich, wie Fabricius dazu kommen konnte, seine Art in die Gattung *Empis* zu versetzen: das Weibchen macht mit seinem kegelförmigen, nach unten gerichteten Rüssel wirklich einen empidenartigen Eindruck. Die seltene, bisher nur in Grossbritannien, Dänemark und Ostpreussen (ausschliesslich an Pilzen) gefundene Art gehört zur Gattung *Triphleba* Rondani subg. *Pseudostenophora* Malloch.

Auf die „*Mantissa*“ liess Fabricius die vier Bände der „*Entomologia systematica*“ folgen; im letzten 1794 erschienenen Bande erwähnt er wieder seine *Empis minuta* und beschreibt 2 neue Phoriden, die eine als *Bibio florea* (p. 255), die andere als *Musca aterrima* (p. 334).

Von *Bibio florea* Fabr. sagt Meigen (1830 p. 222): „Ich habe das in Fabricius' Sammlung befindliche Stück seiner *Bibio florea* selbst gesehen und abgebildet.... seine Beschreibung passt sehr gut. Um so mehr ist es also zu verwundern, wie ein solcher Naturforscher diese Art unter eine Gattung bringen konnte, womit sie doch keinen Zug von Aehnlichkeit hat.“ Der Fall liegt also wieder ganz ähnlich wie bei *Empis minuta*: Anstatt die Notwendigkeit einzusehen, für diese neue Dipterenform eine neue Gattung zu schaffen, versetzt Fabricius sie in eine der bereits vorhandenen und schafft so ein systematisches Rätsel, das ohne Meigen wohl bis heute ungelöst geblieben wäre.

Mit der Veröffentlichung der andern Art, *Musca aterrima*, hat Fabricius einen guten Griff getan. Es handelt sich da um einen Typus, der infolge seiner sammetschwarzen Färbung und glashellen Flügel mit charakteristischem Geäder unter Tausenden von europäischen Dipteren sofort auffällt und darum leicht wiedererkannt werden konnte. So wurden durch *Musca aterrima* die zeitgenössischen Entomologen auf den bis dahin unbeachteten, eigenartigen Dipterentypus der Phoriden aufmerksam gemacht, und auch heute noch ist Fabricius' Art wohl der bekannteste Vertreter der Familie. Das Originalexemplar stammt aus Frankreich, aus dem „*Museum Domini Bosc*“ und ist noch erhalten. Der Kuriosität halber sei erwähnt, dass Fabricius später (1805, p. 323) seine *Musca aterrima* in die Gattung *Tephritis* versetzt und dabei als Synonym zitiert: *Phorus* (!) Latr. Dict. d'hist. nat. 24 197 594.

Dieser „*Dictionnaire*“ stammt aus dem Jahre 1804. Aber schon vor der Wende des Jahrhunderts hatte Latreille der Wissenschaft den Dienst geleistet, durch Aufstellung der Gattung *Phora* endlich die systematische Kategorie zu schaffen, in welcher *Musca aterrima* und ähnliche Formen einwandfrei untergebracht werden konnten. Im „*Précis des caractères génériques*“ (Paris 1796) gibt er folgende Diagnose der Gattung *Phora*, die nach ihm mit *Lispia* und *Musca* eine besondere Familie bildet: *Antennes insérées très près de la trom-*

pe, globuleuses, avec une soie articulée à sa base. Antennules inserées sur les côtés de la tête, à la base de la trompe, oblongues, fortement ciliées. Trompe à tige très courte, terminée par deux grosses lèvres. C. H. (caractères habituels). Tête basse, presque hémisphérique; trois petits yeux lisses. Corcelet convexe. Ailes couchées. Abdomen court, conique. Les quatres pattes antérieures rapprochées; hanches grosses; cuisses et jambes comprimées; tarses longs: deux pelots. Es ist eine ausgezeichnete Charakteristik, bei der nur das zu verwundern ist, dass sie auf das Flügelgeäder mit keinem Worte Bezug nimmt.

Ohne Zweifel errichtete Latreille schon damals die Gattung *Phora* in gütiger Weise, obwohl er keine Art nennt, und mit Rücksicht auf *a terrima*, die er aus Anschauung gekannt haben muss. Wahrscheinlich hat er sogar die Originaltype selbst in Bosc' Sammlung gesehen. Erst 1802 (in: Hist. Nat. Crust. et Ins. Vol. 3 p. 464) nennt er *a terrima* als „Exemple“.

B. XIX. Jahrhundert.

Die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts brachten zunächst nur geringe Fortschritte.

1803 stellt Meigen die Gattung *Trineura* auf, ohne eine bestimmte Art zu nennen; er hatte dabei offenbar die Arten im Sinne, die er im folgenden Jahre publizierte. Als Ueberschrift einer im selben Jahre 1803 von dem Schweizer Maler Schellenberg herausgegebenen Kupferplatte mit 8 farbigen Abbildungen lesen wir den Gattungsnamen *Noda*¹⁾

Beide Namen werden 1809 von Latreille mit Recht als Synonyme von *Phora* zurückgewiesen. Trotzdem, und obwohl von Meigen selbst 1830 als Gattungsname vollständig aufgegeben, bleibt der Name *Trineura* über ein Jahrhundert lang im Gebrauch, und zwar zunächst bei vielen Autoren (Fallén, Zetterstedt u. a.) statt *Phora*. Dann seit Schiner (1864) neben *Phora*. Schiner nämlich beschränkte den Namen *Trineura* willkürlich auf *a terrima* und Verwandte, also auf dieselbe Gruppe, für welche der Name *Phora* von Latreille in erster Linie geschaffen wurde. Er hat dadurch den Meigenschen Namen *Trineura*, der sich durch passende Wahl einer species typica hätte retten lassen, nomenklatorisch für immer unmöglich gemacht. · End-

¹⁾ Die Abbildungen Schellenbergs zeigen überall die 3. Längsader ungegabelt, also wie bei *Phora* Latr. Zur Ergänzung dessen, was Becker (1901 p. 87) über *Noda* [im deutschen Text bei Schellenberg mit „Knotenfliege“ übersetzt] bringt, sei hier folgendes bemerket: Wie aus dem Vorwort des Werkes p. XIII hervorgeht, hat Schellenberg die Abfassung des Begleittextes zu seinem Tafelwerk zwei ungenannten Naturforschern übertragen. Diese waren mit Schellenberg in der Deutung der dargestellten Objekte nicht immer einverstanden, konnten aber an den fertigen Tafeln nichts ändern. So kommt es, dass *Noda* sp. Schellenberg von den Verfassern des Textes als ♂ einer neuen *Ceroplatas* Art (*niger*) hingestellt wird.

gültig — wenigstens für die Spezialliteratur — hat erst Malloch (1912, p. 437) den Namen *Trineura* abgeschafft.

1804 erschien der I. und einzige Band der „Klassifikation der Europäischen Zweiflügeligen Insekten“ von Meigen. Das Wenige, was der damals erst in den Anfängen stehende geniale Dipterologe darin über die „Dreirippenfliegen“ im allgemeinen sagt, zeigt deutlich, dass er inzwischen ebensogut wie Latreille und vielleicht unabhängig von ihm in die morphologische Eigenart der Phoriden eingedrungen ist. Beschrieben werden vier Arten: 1. Schwarze Dreirippenfliege, *T. atra* — später (1830, p. 224) als Synonym von *a terrima* F. eingezogen 2. Gelbfüssige Dr., *T. thoracica* 3. Braunfüssige Dr., *T. rufipes*, eine gemeine, im ♂ Geschlecht sehr kenntliche Art 4. Geringelte Dr., *T. annulata*, von Meigen zeitlebens für eine gute Art gehalten, tatsächlich nur eine Färbungsvariätät von *rufipes* ♀.

1805 begegnen wir bei Latreille (p. 394) einer *Phora pallipes*; sie gilt als ein Synonym von *rufipes* Meig., das von Autoren des 19. Jahrhunderts viel gebraucht wurde. Latreilles unablässiges und erfolgreiches Bestreben, vor allem die Gattungscharaktere der Arthropoden klar herauszuarbeiten, zeigt sich auch in seinem schon genannten Werke von 1809 bei Behandlung der Gattung *Phora*. Nachher heisst es sehr bezeichnend in einer Nota (p. 360): „Characteres ipsi generis vitii plurimis adhuc laborant“ — eine Klage, die noch heute in Bezug auf manche nur oberflächlich begründete Phoridengattungen berechtigt ist!

In den „Diptera Sueciae“ von Fallén (1823) erscheint die Gattung *Trineura* mit *Dipsa* = *Lonchoptera* und *Phytomyza* zu einer Familie „Phytomyzidae“ vereinigt. Die Kennzeichnung der Gattung (p. 5) beruht zum Teil auf eigener Untersuchung, zum Teil auf Kombination der Angaben von Meigen und Latreille. Hier wird zum ersten Male die sonderbare Ähnlichkeit gewisser Phoriden mit Käfern der Gattung *Mordella* hervorgehoben. Ausser *thoracica* Meig. und *atra* Meig. (= *a terrima* F.) beschreibt Fallén acht neue Arten aus Schweden, von denen *abdominalis*, *pulicaria*, *flava* und *fasciata* noch heute den von ihm gegebenen Namen führen. In der Benennung der übrigen Arten war er nicht glücklich. Seine *mordellaria* ist = *subultans* L. Einem Gemisch von zwei oder drei *Gymnophora*-Arten gibt er den schon präokkupierten Namen *rufipes*, indem er behauptet, dies sei die *rufipes* des Fabricius in Syst. Antl. 336 I; für *T. rufipes* Meig. schafft er den (ungültigen) neuen Namen *T. vulgaris*; als Varietät davon, ohne Namen, mit dem Zusatz „Forte spec. distincta?“ beschreibt er ein Tier, das mit *Paraspiniphora maculata* (Meig.) identisch ist.

Der gewaltige Fortschritt, den die systematische Dipterologie im dritten bis fünften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts machte, kam selbst-

verständlich auch der Erforschung der Phoriden zugute. Er knüpft sich an die Namen Meigen, Macquart, Zetterstedt.

Meigen erhab 1830 die Phoriden zum Range einer Familie, die er *Trineurae* nannte und sowohl durch eine Reihe von Abbildungen, wie durch die Familiendiagnose im VI. Bande der „Systematischen Beschreibungen der bekannten europäischen zweiflügeligen Insekten“ vortrefflich charakterisierte. Damit tauchte zugleich die Frage nach der systematischen Stellung der neuen Familie innerhalb der Ordnung der Dipteren auf. Meigen suchte sie stillschweigend dadurch zu lösen, dass er die *Trineurae* zwischen *Borborus*, der letzten Gattung der Musciden, und den *Coriaceae* (Pupiparen), der letzten Dipterenfamilie überhaupt einschiebt. So rückten die Phoriden fast ans Ende des Systems, und das ist die Stelle, wo man sie bei Späteren immer wieder findet. Meigen beschreibt im VI. und VII. Bande insgesamt 3 Gattungen (darunter *Conicera* n.g.) mit 54 Arten; davon stammen 16 von andern Autoren, 38 hat er selbst entdeckt. Von diesen 38 müssen — dies ist das Ergebnis meiner im nächsten Abschnitt mitgeteilten Typenuntersuchungen — 23 als gute Arten, 9 als Synonyme, 6 als species incertae gelten.

Bei Macquart (Hist. nat. ins. Vol. II 1835) sind die Phoriden, die nach dem Vorgange Latreilles (1829) als „*Hypocères*“ bezeichnet werden, wieder eine blosse Subfamilie, die letzte der akalyptraten Musciden. Die Unterschiede z. B. bei den Mundteilen seien nicht genügend, um eine Familie der *Trineurae* darauf zu gründen. Macquart muss aber doch bekennen (I. c. p. 624): „Les Hypocères ont un facies qui leur est propre... les nervures paraissent anormales, et pour la première fois dans l'immense série des Muscides, elles ne présentent qu'une analogie incertaine avec celle de cette famille“. In *Phora arcuata* Meig. und der 1833 von Haliday beschriebenen *Phora galatea* erkennt er mit Recht Vertreter besonderer Gattungen, *Gymnophora* und *Metopina*. Die viel beklagte Mangelhaftigkeit seiner Artbeschreibungen zeigt sich auch bei den acht neuen Phoriden, die er aus Nordfrankreich anführt. Die meisten sind nicht im entferntesten zu deuten, und die Typen sind bis auf die zweier Arten verloren. Gleichwohl verdient Macquart nicht die Geringschätzung, der dieser ehemals so hochgesätzte Dipterologe (vgl. Schiner Dipt. austr. Vol. II p. 226 Ann.) in neuerer Zeit anheimgefallen ist. Die Phoriden hat er nicht ohne Geschick dargestellt, sonst hätte Lioy nicht so viel aus Macquarts Angaben herausholen können, wie wir später sehen werden.

Zetterstedt hat in seinen verschiedenen Werken (*Insecta lapponica* 1838, *Diptera Scandinaviae* Vol. VII 1848, Vol. XII 1855, Vol. XIV 1860) die im Bereiche der skandinavischen Länder gesammelten Phoriden mit grösster Ausführlichkeit beschrieben. Er ändert den Fami-

lienamen in *Trineurides*; ausgeführt werden 1 *Gymnophora*-Art und 18 Arten *Trineura* (47 skandinavische und punctipennis aus Malta). Von den 24 neu benannten sind 11 gute Arten, 8 Synonyme, 5 species incertae. Obwohl er bei der Gattung *Trineura* sechs „Typen“ angibt, hat er leider doch nicht den Versuch gemacht, die einzelnen in der Gattung enthaltenen Formenkreise schärfer gegeneinander abzugrenzen. Er hatte sich dadurch viele Wiederholungen sparen und in weniger Worten mehr sagen können.

Nach dem Erscheinen von Zetterstedts Werk ist in der Systematik der europäischen Phoriden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wenig Bedeutendes mehr geleistet worden. Ein minderwertiger Entwurf von Winnertz (vgl. Schmitz 39) mit 119 angeblich neuen Arten blieb glücklicherweise unveröffentlicht. Publiziert wurden fast nur noch vereinzelte neue Arten (Loew, v. Frauenfeld, Gobert u.a.), wie dies auch schon früher hie und da geschehen war (Lehmann, v. Roser, Gimmerthal, A. Costa). Sonst waren unsere Dipterologen ähnlich wie Schiner (1864) und hauptsächlich an der Hand seiner Darstellung fast nur bemüht, in den von ihnen untersuchten Phoriden die Arten der grossen Autoren, besonders Meogens, wiederzuerkennen, wobei sie sicher in vielen Fällen zu Fehlbestimmungen gelangten. Nur die Österreicher Egger (1862) und G. Strobl (in den neunziger Jahren) wagten es, eine grössere Anzahl von Arten als neu zu beschreiben. Von den 6 Eggerschen Arten ist nur eine haltbar, während manche steirische Arten Strobls sich in der Tat als berechtigt erwiesen haben.

Die erste exotische Phoride machte 1830 Wiedemann bekannt (peregrina aus Kanton). Macquart, Coquerel, Bigot, Walker, Loew, v. Frauenfeld, Schiner, Weienberg fügten einige andere hinzu. Loew beschrieb 1857 die erste aberrante Phoride mit verkümmerten Flügeln (*Psylloomyia testacea*) aus „Caffraria“. Er war es auch, der die Erforschung der Phoridenfauna Nordamerikas 1866 mit 6 neuen Arten inaugurierte. Aldrich und Coquillett entdeckten mehrere andere, aber die Hauptarbeit blieb auch auf diesem Felde dem 20. Jahrhundert vorbehalten.

Die in die Mitte des 19. Jahrhunderts fallenen Versuche Rondanis und Lioys, die allzu dürftige, von Meigen und Macquart überkommene Gattungseinteilung zu revidieren, werden uns im Abschnitt „Klassifikation der Phoriden“ noch besonders beschäftigen. Hier sei nur einiges zur Kennzeichnung der beiden Autoren hervorgehoben. In Rondanis „Dipterologiae Italicae Prodromus“ erscheint die Familie unter dem 1851 von Haliday (apud Walker, Ins. Brit. Dipt. p. 9) zuerst eingeführten Namen *Phoridae*. Sie steht neben den Lonchopteridae, eine Zusammenstellung, die sich schon bei Fallén findet. Was Rondani weiter bietet, hält sich keineswegs auf der gewohnten

Höhe der Leistungen dieses berühmten italienischen Meisters. Die beiden Subfamilien („Stirpes“) werden nach der Pubeszenz der Fühlerborste (!) und der Stirnlänge (!) unterschieden, die beiden neuen Gattungen mit atrophierter 7. Längsader, *Palpimeda* und *Triphleba*, nach blossen Artmerkmalen. Auch die Diagnose der nur aus formalen Gründen berechtigten neuen Gattung *Megaselia* trifft nicht das Wesentliche. Rondani scheint nur ein beschränktes Material von Phoriden besessen zu haben. Die Arten mit ungegabelter 3. Längsader fasst er zu einem neuen Genus *Philodendria* zusammen, das mit Rücksicht auf die Genotype *a terrima* F. nur als Synonym von *Phora* zu werten ist. Alle übrigen Arten rechnet er zu *Phora*.

Das Werk van P. Lioy „Ditteri distribuiti secondo un nuovo metodo di classificazione naturale“ 1864 erscheint als ein psychologisches Rätsel und ist jedenfalls ein sonderbares Unicum in der gesamten dipterologischen Weltliteratur. Ohne eine Dipterenansammlung zu besitzen, allein gestützt auf einen kleinen Teil des einschlägigen Schrifttums unternahm es dieser Mann, ein umfangreiches Dipterenystem mit 194 neuen Gattungen niederzuschreiben! Für die Klassifikation der Phoriden hat er ausschliesslich Macquart benutzt, den er nach seiner „neuen Methode“ und nach allen Regeln der — Kompilation vollständig ausschöpft. In dem er die Unterabteilungen in dem Macquartschen Bestimmungsschlüssel der Gattung *Phora* zum Range von Gattungen erhebt und hie und da für einzelne Arten, in deren Beschreibung er ein ihm wichtig erscheinendes Merkmal antraf, noch besondere Gattungen aufstellt, gelangt er zu nicht weniger als 8 neuen Genera. Bis in die letzte Zeit hinein wurden diese ähnlich wie die Rondanis von den meisten Systematikern ignoriert, aber die Forderung, das Prioritätsprinzip auch auf Lioys Schöpfungen in objektiver Weise anzuwenden, lässt sich nicht abweisen und führt zur teilweisen Anerkennung derselben, vgl. Schmitz, Lioy als Dipterologe in: Verhandlungen des III. Internat. Entomologenkongresses, Zürich 1925.

Es erübrigt noch, auf dasjenige kurz einzugehen, was die ältere Forschung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts über die Lebensweise, Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Phoriden ermittelt und überliefert hat. Methodisch und vergleichend sind diese Dinge damals kaum untersucht worden, man findet nur zerstreute und vermischtte Mitteilungen darüber. So heisst es z. B. bei Meigen (Syst. Beschr. VI (1830) p. 211): Man findet diese Fliegen auf Blättern, auf Gesträuch und in Hecken; sie sind ausserordentlich lebhaft und laufen mit der grössten Schnelligkeit auf den Blättern hin und her. Sie besaugen aber auch die Blumen, besonders der Schirmgewächse. Ihre Erscheinungszeit ist meistens der Spätsommer und Herbst. Von ihrer Naturgeschichte weiss ich weiter nichts zu sagen, als dass die

Larven (wenigstens einer Art) in Schmetterlingen leben sollen. Herr Kunstmärtner Bouché in Berlin erhielt sie aus der Sphinx *Convolvuli*.“ In diesen Sätzen hat Meigen alles zusammengefasst, was er über Beiträge, Aufenthalt, Nahrung und erste Zustände der Phoriden wusste.

Das eigentümliche Beitrage der Imagines, ihr schussweises im Zacken Laufen, das besonders an Fenstern gut beobachtet werden konnte (Schiner 1864, Girard 1885) hatte schon Scopoli (1763) bemerkt und zur Namengebung verwendet (*Musca „festinans“*). Linné erwähnt flohartige Sprünge der Phoriden am Boden und Tanzflüge in der Luft, letztere sah auch Zetterstedt bei *stictica* und *a terrima*; nach ihm sind bisweilen mehrere Arten (die er Varietäten nennt) in demselben Schwarm vertreten.²⁾ Zetterstedt hat auch sonst seinen Beschreibungen manche gute Angaben über den Aufenthalt der Phoriden eingestreut; er kennt die Vorliebe gewisser Arten für Baumstämme (*thoracica*), ihr Überwintern in Moos (*rufipes*), die vertikale Verbreitung bis zu bedeutender Meereshöhe (*a terrima* (?) *sordida*), das Vorkommen in der Nähe des Wassers (*incrassata*), auf Blumen (*abdominalis*). Als Nahrungsquelle für die Imagines und vermutliche Brutstätte wurden im allgemeinen faulende vegetabilische und animalische Stoffe festgestellt, Pilze, Dünger, gelegentlich Käse, Tier- und Menschenleichen (an letzteren verschiedene vermutlich oft unrichtig angegebene Arten, wohl meist identisch mit *Triphleba perennis* (Meig.) und *Conicera tibialis* Schmitz), besonders oft tote Insekten. Widersprechende Angaben finden sich über die Biologie der Larve von *Megaselia rufipes* (Meig.); nach Brischke soll sie (er zitiert *Trineura rufipes* Fallén, das wäre eine *Gymnophora!*) als Blattminierer in *Cirsium arvense* leben, was ganz unglaublich ist (vgl. Frost, A study of the leaf-mining diptera of North America, Cornell Univ. Mem. 78 (1924) p. 32, 33). Nach den von Meigen zitierten Beobachtungen von Bouché wäre sie parasitisch an Lepidopteren (Naturgesch. d. Insekten 1834) Ahnliche Beobachtungen wurden auch später wiederholt mitgeteilt (besonders ausführlich von Hartig 1837); sodass ein (gewiss nur facultativer) Parasitismus dieser Art kaum bezweifelt werden kann. Brischke züchtete Larven, die von einem lebenden Käfer per anus ausgeschieden wurden (1867); nach Speiser

²⁾ Die Gewohnheit, tanzend in der Luft zu schwärmen, kommt wohl bei allen echten *Phora*-Arten vor, und damit hängt wahrscheinlich die Vergrösserung der Augen bei den ♂♂ dieser Gattung zusammen, die sich bei *velutina* Meig. bis zu einem Grade steigert, den man schon als Pseudoholopticismus (Osten-Sacken 1896 p. 367) bezeichnen kann. Noch auffallender wird diese Erscheinung bei gewissen südamerikanischen Gattungen z. B. *Trineurocephala* Schmitz. Bei *Auxanommatidia* Borgmeier sind sogar die Fazetten der vorderen Augenhälften ähnlich wie bei Pipunculiden vergrössert.

handelte es sich auch in diesem Falle um *rufipes*. Dergleichen Beobachtungen gaben durch Verallgemeinerung Anlass, den Phoriden einen speziellen Entomoparasitismus zuzuschreiben, der tatsächlich ihrer übergrossen Mehrzahl fremd und nur auf ganz bestimmte Gattungen und Arten beschränkt ist. Der echte und eigenartige Parasitismus der Larve von *Phalacrotophora fasciata* (Fall.) an Coccinellidenpuppen wurde zuerst von Westwood (1840) nach Beobachtungen Carpenters angedeutet und später öfter bestätigt (Rondan 1860, Giraud bei Schiner 1864), aber erst 1920 von Lichtenstein vollständig aufgeklärt. Den Endoparasitismus von *Borophaga (Pero-mitra) incrassata* (Meig.) bei Bienenlarven entdeckte und schilderte Assmus 1865. Verrall (1877) und Lubbock (1883) beschrieben *Pseudacteon formicarum* (Verr.) als Parasit von *Lasius niger* in England; aber schon lange vorher war dieser winzige Ameisenschmarotzer ihrem Landsmann Westwood wohlbekannt (Introduction etc. Vol. II p. 574: „I have repeatedly observed, on disturbing the nest of the common brown garden ant, a very minute species of *Phora* hovering over and flying upon the ants“). Von den sonst vor 1900 bei Ameisen gefundenen Phoriden (siehe Wasmann, Kritisches Verzeichnis etc. 1894) ist wahrscheinlich nur *Platyphora lubbocki* Verrall 1877 (Syn. *Aenigmatias blattoides* Meinert ♀) streng myrmekophil.

Die erste freilich unvollkommene Kenntnis der Phoridenlarven und Puparien verdankt man der „Naturgeschichte der Insekten“ von Bouché 1834. Darin werden die Entwicklungsformen beschrieben von *Conicera atra* Meig. und *Megaselia rufipes* (Meig.); denn mit *rufipes* sind wohl Bouchés *Phora sphingicidae* und *heracleella* identisch. Die Metamorphose von *M. rufipes* ist später noch wiederholt dargestellt worden, aber stets ebenso unzulänglich wie von Bouché; erst Kieffer (1900) hat eine gute Beschreibung der Larve geliefert. Die von Méggin (La faune des cadavres Paris 1894) abgebildeten angeblichen ersten Stände von *Phora aterrima* (F.) gehören offenbar zu einer *Conicera*-Art (Beweis: Méggnins Fig. 13 b und c), wie schon Dahl richtig gesehen hat.

Die ältere Literatur über Phoridenlarven wurde 1883 von Brauer zusammengestellt, der nur wenig übersah.

Das Beste, was von älteren Autoren auf dem Gebiete der Entwicklungsgeschichte, Morphologie und Anatomie der Phoriden geleistet worden ist, findet sich in drei auch heute noch beachtenswerten Abhandlungen von L. Dufour: 1) Mémoire sur les métamorphoses de plusieurs larves fongivores appartenant à des diptères, etc. in: Annal. sci. nat. (2) XII 1839 p. 5—60. 2) Recherches sur les métamorphoses du genre *Phora* et description de deux espèces nouvelles de ces Diptères, avec (21) fi-

gures, in: Mém. Soc. R. scienc. d. l'agric. et d. arts de Lille Vol. XVIII, année 1840 (gedruckt 1841) p. 414—424. 3) Recherches anatomiques et physiologiques sur les diptères, etc. in: Mém. présent. à l'Acad. sci. Paris Sc. math. et phys. Tom. 11 1851 p. 171—360 (Separat 1850). Es kommen zwar bei Dufour Irrtümer vor,³⁾ aber ihnen steht eine Fülle von ausgezeichneten Beobachtungen gegenüber, die er durch sorgfältiges Studium und geschickte Anwendung des Seziersmessers und Mikroskops gewonnen hat. In der ersten Abhandlung beschreibt Dufour hauptsächlich die Larve und Puppe von *Phora pallipes* Latr. = *M. rufipes* (Meig.). In der zweiten, wichtigeren behandelt er *Phora nigra* Meig.; die er wahrscheinlich richtig determiniert hat (Syn. *albidohalteris* Felt = *derasa* Wood, Larve in Pilzen!), sowie die Puppen und Imago einer von ihm aus verwaisten Schneckenhäusern gezüchteten neuen Art, *Phora helicivora* Duf. (nicht identisch mit *Ph. maculata* Meig. s. Abschnitt II, Typenuntersuchungen). Von dem Puparium gibt Dufour eine sehr gute Beschreibung, die Bildung der Prothorakalhörner hat er Schritt für Schritt verfolgt und ihre wahre Natur — wohl unabhängig von Bouché — genau erkannt; er entdeckt auch die physiologisch interessante Tatsache, dass die Entwicklung der *maculata*-Puppe durch Wärme nicht beschleunigt werden kann. In der Beschreibung und Abbildung der Imago findet man erstaunlich viele Angaben von solchen Einzelheiten, die erst in neuerer Zeit wieder entdeckt und als charakteristische Familien- oder Gattungseigentümlichkeiten beachtet und für die Phoridensystematik ausgewertet wurden. — Die anatomischen Untersuchungen Dufours in der dritten obengenannten Schrift sind, soweit sie die Splanchnologie der Imagines betreffen, bis heute auf diesem Gebiete die einzigen geblieben⁴⁾.

Gegen Ende der neunziger Jahre wurde das Interesse für die Phoriden in weiteren zoologischen Kreisen geweckt durch die kühne Hypo-

³⁾ Dufour behauptet z. B. das Fehlen jeglicher Häutung bei pilzbewohnenden Larven, auch denen der Phoriden, die Beschreibung der Malpighischen Gefäße ist in mehrfacher Hinsicht unkorrekt. Die Beobachtung, dass die Randaderwimpeln bei *helicivora* von dem lebenden Tiere nach Belieben aufgerichtet und niedergelegt werden können, klingt zwar befremdend, ist aber vielleicht doch richtig. Borgmeier sagt nämlich von *Schmitzia spiniceps*, einer brasiliischen Phoride mit langbeborsteten Flügelrudimenten: „Ich sah deutlich, wie das Tier scheinbare Anstrengungen machte zu fliegen, indem es die Borsten der Flügelrudimente auseinanderspreizte und in Schwingung versetzte“. (1923 p. 171).

⁴⁾ Nur die Malpighischen Gefäße einiger Arten sind von Veneziani und dem Verfasser (1916) untersucht und dargestellt worden. Es wäre zu wünschen, dass der gründlichen Arbeit Assmuths über die Anatomie der Termitoxeniiden bald eine ähnliche über Phoriden an die Seite gestellt würde. Die in Schneckenhäuschen sich entwickelnden *Paraspiniphora*-Arten würden ihrer Grösse und der leichten Zucht wegen ein besonders empfehlenswertes Objekt dafür sein.

these Fr. Dahls, dass die Flöhe mit ihnen nahe verwandt seien und phylogenetisch mit den Phoriden und Scatopsinen zusammenhingen. Dahl, schon länger mit dem Sammeln und Studieren europäischer Phoriden beschäftigt (Bodenfänge aus den verschiedensten Gegenen Deutschlands im Museum f. Naturkunde Berlin, von mir 1918 neu durchbestimmt), hatte von einer Studienreise im Bismarck-Archipel 1896/97 ein Tausende von Exemplaren umfassendes Phoridenmaterial heimgebracht, worunter sich mehrere eigentümliche flügel- und schwingerlose, seiner Ansicht nach auffallend flohähnliche Formen befanden. Er publizierte einige davon im Zool. Anzeiger (1897) und Sitz.-Bericht Ges. naturf. Freunde Nr. 10 (1898); einer Art gab er den bezeichnenden Namen *Puliciphora lucifera* „da sie zum ersten Male Licht in eine dunkle Sache (die Phylogenie der Puliciden) zu bringen scheint“. Dies lockte eine ganze *Puliciphora*-Literatur hervor, eine sehr interessante Lektüre! Dahl blieb mit seiner unhaltbaren Ansicht, die in der Hauptsache auf eine neue Deutung der Pulicidenmundteile hinauslief, vollständig allein. Die Gegenschriften enthalten teils wohlbegündete, sachlich aufbauende Kritik (Heymons 1899), teils schroffen, über das Ziel hinausschiessenden Widerspruch (Wandolleck 1898 a. u. b.). In dem Bestreben, Dahl in möglichst vielen Punkten anzugreifen, ging Wandolleck so weit, die Phoridennatur von *Puliciphora* überhaupt zu leugnen und sogar den Namen zu verwerfen; er ersetzte ihn durch *Stethopathus* und errichtete für diese und einige andere Gattungen (*Chonoccephalus*, Wandolleck, *Wandolleckia*⁵⁾ Cook) die — natürlich unhaltbare — Familie *Stethopathiidae*. E. Rübsamen zeichnete für Wandollecks Arbeit (1898 b) künstlerisch vollendete Abbildungen, die schönsten, wenn auch nicht die genauesten, die wir in der ganzen Phoridenliteratur besitzen.

Das weitere Material vom Bismarck-Archipel hat Dahl zwar sorgfältig und mit grossem Verständnis gesichtet, aber nicht veröffentlicht. Es wurde später dem Verfasser zur Bearbeitung anvertraut und lieferte eine Reihe von neuen Gattungen und Arten, die mit Ausnahme der *Megaselia*-Arten im Folgenden endlich — nach 30 Jahren — zur Beschreibung gelangen.

C. XX. Jahrhundert.

Wenn wir auf das soeben vollendete erste Viertel unseres Jahrhunderts zurückblicken, so

⁵⁾ Es ist ein Irrtum, wenn Wandolleck behauptet, Cook habe der Genotype keinen Namen gegeben; in Science (N. S. VI (1897) p. 886, abstract of the minutes of the Biological Society of Washington) findet sich der Name *Wandolleckia achatinae* Cook. Derselbe Irrtum veranlasste Brues (1903 p. 392) zu der Aufstellung des Synonyms *W. Cooki* Brues. Vgl. J. Bequaert bei Pilsbry, Land Mollusks of the Belgian Congo, in: Bull. Amer. Mus. Nat. History Vol. 40 (1919) p. 61.

müssen wir mit Genugtuung feststellen, dass es für die Erforschung der Phoriden sehr fruchtbar gewesen ist. Am Anfang desselben waren, wenn man von den species incertae und Synonymen absieht, rund hundert Arten bekannt; inzwischen hat sich die Zahl etwa verachtacht! Dieser schöne Fortschritt ist hauptsächlich der intensiven Arbeit einiger Spezialisten zu verdanken.

Eingeleitet, angeregt und ermöglicht wurde er durch die 1901 erschienene grundlegende Monographie von Th. Becker „Die Phoriden“, eine der vielen vorzüglichen Einzeldarstellungen des berühmten deutschen Meisters der Dipteroologie. Sie beruht auf umfassender Kenntnis der Literatur. Studium einer grossen Anzahl von Sammlungen und der erreichbaren Typen. Ihr Hauptverdienst liegt in der Durchdringung, Sichtung und klaren systematischen Darstellung des vorhandenen, unübersichtlich gewordenen Stoffes. Dass sie nicht frei von Irrtümern und Lücken und überhaupt gegenwärtig veraltet ist, liegt in der Nader Sache.

Die Auffassung und Umgrenzung der europäischen Gattungen ist dieselbe wie bei Schiner; die Gattung *Phora* wird jedoch in zwei Gruppen zerlegt: die erste Gruppe umfasst die Arten mit rückwärts gerichteten Supraantennalen und mit Einzelborsten an den Schienen, die zweite die Arten mit vorwärts gesenkten Supraantennalen und ohne Schienenborsten⁶⁾. Beide Gruppen sind seither in eine grössere Anzahl von Selbständigen Gattungen aufgeteilt worden, die zum Teil als Artenkomplexe innerhalb der Gruppen bei Becker schon kenntlich sind. Die als neu beschriebenen 23 Arten (3 davon sind Synonyme) sind durchweg grössere und nach heutigen Begriffen leicht kenntliche Formen; Hunderte von mittleren und kleinen europäischen Phoriden sind Becker unbekannt geblieben, teils weil sie zu seiner Zeit wenig gesammelt wurden, hauptsächlich aber, weil die von ihm angewandte Lupenvergrösserung und die S. 7. und 8 seiner Monographie entwickelten Prinzipien zu ihrer Unterscheidung nicht ausreichen. Auf die Abbildungen der fünf beigegebenen Tafeln kann man sich in kritischen Fällen nicht immer verlassen; schon gleich die erste Figur z. B. ist unkorrekt.

(Wordt vervolgd).

⁶⁾ Die erste Erwähnung der „Senkbörsten“, wie ich die vorwärts geneigten Supraantennalen genannt habe (2282), findet sich bei Macquart (1835), der sie bei seiner *vermeintlichen Phora thoracica* Meig. (tatsächlich *meigeni* Beck) entdeckte. Sie werden auch von A. Costa bei *Megaselia brunneipennis* (1857) richtig beschrieben und von Aldrich (1892) zuerst abgebildet. Kowarz sagt in „Fliegen Böhmens“ (1894) p. 35 Anmerkung: *Phoram species dividenda setis frontalibus seriei anticae aut decussis aut erectis.*

Ter Drukkerij voorh. CL. GOFFIN

Nieuwstraat 9, Maastricht

is verkrijgbaar

Geologische en Palaeontologische
Beschrijving van het Karboon
der omgeving van Epen (Limb.)

door

W. J. JONGMANS

met medewerking van

G. DELÉPINE, W. GOTHAN, P. PRUVOST, F. H. VAN RUMMELEN en N. DE VOOGD.

(Mededeeling No 1 van het Geologisch Bureau voor het Nederlandsch Mijngebied).

32 bladz. tekst groot kwarto formaat met ± 150 figuren,
uitgevoerd op zwaar kunstdrukpapier.

Prijs per exemplaar fl. 2.50.

Prijs per exemplaar fl. 2.50.

Ter Drukkerij voorh. Cl. Goffin, Nieuwstraat 9,

is verkrijgbaar:

De Nederlandsche Mieren en haar Gasten

door

P. H. SCHMITZ S.J.

(146 bladzijden, met 56 figuren).

Ingenaaid fl. 1.90, gebonden fl. 2.40 per exemplaar.

Dit mooie boek is, om wille van inhoud en **stijl**, zeer geschikt als **leesboek**
op Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Kweekscholen.

VERLANGT U

GOED UITGEVOERD
DRUKWERK

dan is het aangewezen adres
Drukkerij en Registerfabriek
v.h. CL. GOFFIN,
Nieuwstraat 9, Tel. 45, Maastricht.